

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su : 26.06.2012/8751

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|---------------|--|--|--|
| Elma | Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>) Elma ağkurdu (<i>Yponomeuta malinellus</i>) | 20 ml/100 L su larva 15 ml/100 L su larva | 14 gün |
| Hububat | Süne (<i>Eurygaster spp.</i>) | 15 ml/da 1-3 ve 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin | 14 gün |
| | Hububat hortumluböceği (<i>Pachytychus hordei</i>) | 15 ml/da | 14 gün |
| Zeytin | Zeytin sineği (<i>Bactrocera oleae</i>) | 25 ml /100 L su | 14 gün |
| *Bağ | Maymuncuk (<i>Otiorynchus spp</i>) | 30 ml /100 L su | 14 gün |
| Mısır | Mısır koçankurdu (<i>Sesamia spp.</i>) | 40 ml/da larva yumurta ilk tespit edildiğinde uygulamaya başlanır (15 gün ara ile 3 uygulama yapılır) | 14 gün |
| | Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>) | 40 ml/da larva yumurta ilk tespit edildiğinde uygulamaya başlanır (15 gün ara ile 3 uygulama yapılır) | 14 gün |
| Pamuk** | Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>) | 200 ml/da larva | 14 gün |
| Domates | Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>) | 50 ml/da | 14 gün |
| Fındık | Fındık kurdu (<i>Curculio nucum</i>) | 40 ml/da | 14 gün |
| Şeker pancarı | Kalkan böcekleri (<i>Cassida spp.</i>) | 15-20 ml/da | 14 gün |

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

**Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz

PlatinKimya

CRICKET 100 EC
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

| | | |
|------|----|-----------------------------|
| GRUP | 3A | İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) |
|------|----|-----------------------------|

100 g/L Alphacypermethrin

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız .

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayınız. Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullandıktan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Mukozayı tahriş eder.Ciltte yanma ve baş ağrısı, bulantı ve kusma olabilir.

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :
İÇİNDEKİLER
Alphacypermethrin,Emülgatör,ksilen
ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H301 Yutulması halinde toksiktir.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koryucu eldiven/koryucu kıyafet/göz

koryucu/yüz koryucu kullanın

P304+340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P391 Döküntüleri toplayın

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

2019 ARSLAN
Ulusal Zehir Merkezi
Platin Kimya
Umsatış ve Dış Ticaret A.Ş.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ UZEM TEL: 114



29 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesi uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma içkurdu: Elma içkurdu'na karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her dölle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılır.

Hububat hortumlu böceği: topraktan çıkıştan 10 gün sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Hububat Süne : Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Mısır kurdu ve Mısır koçan kurduna karşı: ilk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 .uygulama daha yapılır.

Pamukta yeşilkurtta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğu uygulamaya karar verilir.

Zeytin sineğine karşı : meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Domateste yeşilkurtta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2'den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.



CRICKET 100 EC EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

| | | |
|------|----|-----------------------------|
| GRUP | 3A | İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) |
|------|----|-----------------------------|

100 g/L Alphacypermethrin

İLK YARDIM ÖNEMLERİ :

Ağızdan alınması halinde Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. Hastayı kusturmaya çalışmayınız. Ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde Göz ile temas halinde en az 15 dakika bol suyla yıkayınız. Doktor çağırınız.

Deri ile temas halinde İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırınız.

Solunması halinde Hastayı açık havaya çıkarınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ UZEM TEL: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Arlara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

-Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

-Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalandırılan sıkıca kapalı kapta kilit altında muhafaza ediniz .

-Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

-Boş ürünün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veyahata tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş

Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26

Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde No: 38

Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75



29 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :CRICKET 100 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için CRICKET 100 EC 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU :

Yüksek alkali özellik gösterenler hariç diğer insektisit ve fungusitlerle karışabilir. Karışım yapmadan önce karışım denemelerinin yapılması ve karışım yapılacaksa ilaçların ayrı ayrı sulandırıldıktan sonra karıştırılmaları tavsiye edilir.



CRICKET 100 EC
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

| | | |
|------|----|-----------------------------|
| GRUP | 3A | İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) |
|------|----|-----------------------------|

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:
PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Sarıyer /İstanbul
TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78
ÜRETİM TESİSİ:
PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde No: 38
Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Platin Kimya
Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş.
Zeynep AKSLAN
Genel Müdür

M

29 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

