

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Sarj No:  
Ruhsat tarih ve No.su :

**KULLANILACAGI BITKI VE ZARARLI ORGANIZMALAR**

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Armut	Armut psillidi ( <i>Cacopsylla pyri</i> )	100 ml/100 L su, nimf - ergin	21 gün
Elma	Elma yeşil yaprakbiti ( <i>Aphis pomi</i> )	50 ml/100 L su, nimf – ergin	21 gün
Şeftali	Şeftali yaprakbiti ( <i>Myzus persicae</i> ) Dut kabuklubiti ( <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> )	75 ml/100 L su, nimf – erg 75 ml/100 L su, larva	21 gün
* Bağ	Turunçgil unlubiti ( <i>Planococcus citri</i> )	100 ml/100 L su, nimf - ergin	14 gün
Marul	Yaprakbitleri Şeftali yaprakbiti ( <i>Myzus persicae</i> ) Pamuk yaprakbiti ( <i>Aphis gossypii</i> ) Marul yaprakbiti ( <i>Nasonovia ribisnigri</i> )	75 ml/da, nimf - ergin	7 gün
Domates (sera)	Tütün beyaz sineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	100 ml/100 L su, larva – pupa	3 gün
Domates (tarla)	Patates yaprakbiti ( <i>Macrosiphum euphorbiae</i> )	75 ml/da, nimf - ergin	3 gün
Biber (sera)	Tütün beyaz sineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	100 ml/100 L su, larva – pupa	3 gün
Patlican (sera)	Tütün beyaz sineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	100 ml/100 L su, larva – pupa	3 gün
Pamuk	Pamuk yaprakbiti ( <i>Aphis gossypii</i> )	100 ml/da, nimf – ergin	-

05 Nisan 2021

X/ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



**STOPTECH**  
Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	23	İNSEKTİSIT (Böcek ilaçı )
------	----	------------------------------

100 g/L Spirotetramat

Önce etiketi okuyunuz  
Evde kullanmayın  
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.  
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayın.  
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayın.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Bulantı,kusma,baş ağrısı ,deri,göz,solunum yolları ve organlarında yüksek oranda tahrış.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM ) TEL: 114**

Dr. Nevzat ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı V.

Net Miktarı :  
Brüt Ağırlığı :  
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :  
**içindekiler**  
Spirotetramat (ISO) ve yardımcı maddeler

**ZARARLILIK İŞARETLERİ :**



**UYARI KELİMESİ : TEHLIKE**

**ZARARLILIK İFADELERİ**

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki..

**ÖNLEM İFADELERİ**

P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş giysileri işyeri dışına çıkarmayın.

P302 + P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333 + P313 Ciltte tahrış veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P321 Özel müdahale gereklili (etikete bakın)

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P391 Döküntülerini toplayın

P280 Koruyucu giyaset, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın.

PLATIN KİMYA  
Mühendislik ve İstihdam A.Ş.  
AYŞE TÜMAY  
Ziraat Yüksek Mühendisi

Karpuz	Pamuk yaprakbiti ( <i>Aphis gossypii</i> )	75 ml/da, nimf - ergin	3 gün
--------	---	---------------------------	-------

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki koruma ürünü önce ayrı bir karta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

**KALIBRASYON:** Uygulama öncesi uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKINASININ TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Armut pisillidine karşı** kişlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerinin görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15'ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlısı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.


**Elma yeşil yaprakbitine karşı** vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

**Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı** çiçek tomureuklarının belirmesinden, populasyonun 3/4'ü kanatlı forma dönüşümeye deðin 50 aðaþta 7 bulaþık dala rastlanıldığından uygulama yapılmalıdır.

**Şeftalide dut kabuklubitine karşı** uygulama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

05 Nisan 2021

X  
TARIM VE ORMAN BAKANLIÐI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜÐU  
KABUL EDILMIÐTIR.



### STOPTECH

Süspsiyon Konsantre (SC)

GRUP	23	İNSEKTİSIT (Böcek ilaçı )
------	----	------------------------------

100 g/L Spirotetramat

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mükünse etiketi gösterin).

**Soluma :** Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Aðzi ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

**Yutma :** Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruz kalma bölgesindeńin başka bir yere götürün. Aðzi ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

**Ciltle Temas :** Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su ve sabunla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrîsin gelişmesi halinde doktora başvurun.

**Gözlerle Temas :** Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın.

En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Beirtere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Dr. Nazan ÇAKIR ARÇAN  
Daire Başkanı

### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDILECEK HUSUSLAR:

-Arılar zehirlidir. Çiçeklenmedenemi kullanmayın.  
-Balıklara zehirlidir. Yer üstü ve yeraltı sularına bulaştırmaktan kaçınır  
-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

-Bitki koruma ürününün ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız.  
-Bulaþık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı su ile yıkayınız.  
-Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. başka gaye içip kullanmayın.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI :

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

PLATIN KİMYA  
Mühendislik ve İŞ Tic. A.Ş.  
AYŞE YÜMÜK  
Ziraat Yüksek Mühendisi

**Marulda yaprakbitlerine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.**

**Domates (sera), Biber (sera), Patlıcan (sera) tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir, alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.**

**Bağda turunçgil unlubitine karşı** mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem asmanın gövdesindeki kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığında turunçgil unlubitinin yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönem koruklar yaklaşık nohut büyülüğünde olup yalnız turunçgil unlubitinin görüldüğüasmalará uygulama yapılmalıdır. İkinci dönem turunçgil unlubitinin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı dönemdir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.

**Domateste patates yaprakbitine karşı** tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek, 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupa yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.


**Pamukta yaprakbitine karşı** tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcek popülasyonu yoğun ise ilaçlama ertelenmelidir. Tarla kontrollerinde bir yaprakta ortalama 25 adet yaprakbiti saptandığında kimyasal mücadele yapılmalıdır.

**Karpuzda Pamuk yaprakbitine karşı** tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek, 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupa yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

05 Nisan 2021



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KARITEL EDİLMİŞTİR.



**STOPTECH**  
Süpansiyon Konsantre (SC)

GRUP	23	İNSEKTİSİT (Böcek ilaçı)
------	----	-----------------------------

100 g/L Spirotetramat



**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:**  
PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş  
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No :21/26  
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

**ÜRETİM TESİSİ:**

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş  
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısim 1.Cadde  
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA  
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75


**PLATİN KİMYA**  
Mümessilik ve Dis Tic. A.Ş.  
**AYŞE TÜMAY**  
Lilaot Yüksek Mühendisi

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ :**

**STOPTECH** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için **STOPTECH**'m aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayıınız. Uygulamanın tekrarlanması gereği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU :**

Diğer bitki koruma ürünleri ile büyük miktarda karışım hazırlamadan önce ön karışım testlerinin yapılması tavsiye edilir.



**STOPTECH**  
Süspansiyon Konsantre (SC)

<b>GRUP</b>	<b>23</b>	<b>İNSEKTİSİT (Böcek ilaçı)</b>
-------------	-----------	-------------------------------------

100 g/L Spirotetramat


**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA :**

PLATIN KİMYA MÜMESSİLİK VE DIŞ TİC.A.Ş  
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No :21/26  
Sarıyer /İstanbul  
TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

**ÜRETİM TESİSİ :**

PLATİN KİMYA MÜMESSİLİK VE DIŞ TİC.A.Ş  
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısmı 1.Cadde  
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA  
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

**PLATİN KİMYA**  
Mümessilik ve Diş Tic. A.Ş.  
AYŞE TÜMAY  
Ziraat Yüksek Mühendisi



05 Nisan 2021

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
KABUL EDILMIŞTIR.