

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su :07.03.2018/11075

KULLANILACAGI BITKI VE ZARARLI ORGANIZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Muz	Muz fusarium solgunluğu (<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i>)	1000ml/da	21 gün
Pamuk	Pamukta Fide kök çürüklüğü (<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium</i> spp., <i>Alternaria</i> spp., <i>Macrophomina</i> spp., <i>Verticillium</i> spp., <i>Aspergillus</i> spp.)	300ml / 100 kg hayvansız tohumla 500 ml / 100 kg hayvansız tohumla	---
Domates (Tarla)	Sebze Fidelerinde kök çürüklüğü (<i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)	250 ml /100 su (10 ml/m ² 4 L su)	14 gün
Biber (Tarla)	Sebze Fidelerinde kök çürüklüğü (<i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)	250 ml /100 su (10 ml/m ² 4 L su)	14 gün
Yerfıstığı	Yerfıstığında kökboğazı çürüklüğü (<i>Aspergillus niger</i>)	400 ml / 100 kg tohumla	-
Mısır	Mısırda Tohum ve Kök çürüklüğü, Fide yanıklığı hastalıkları (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)	100 ml /100 kg tohumla	-
Tütün	Tütün fidelerinde Çökerten (<i>Rhizoctonia solani</i> <i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)	7,5 ml/m ² 3 L su ile	21 gün



MOBITAR 35

Tohum ilaçlaması için Akıcı Konsantre (FS)

GRUBU	E2:12	A1:4	FUNGİSIT (Mantar ilacı)

25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-M

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınuz

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayınuz.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınuz.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koymak iyiçe çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

iÇİNDEKİLER

Fludioxonil ,Metalaxyl- M

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimini arayın.

P391 Döküntülerini toplayın.

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karışım devam ederek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmmalıdır.

26 Mart 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Damlama sulama için : Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Hazırlanan karışım ilave edilir.

Karıştırma devam edilerek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır.

Tohum uygulaması için: Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohumlu püskürme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılır. Uygun ekipman bulunmamastur durumunda, tohumlar düz bir zemin üzerine yayılıarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılabilir. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ve mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gereklidir.

KALİBRASYON: Uygulama öncesi uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKINASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayıza. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayıza.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Muz-Muz Fusarium Solgunluğu:

Fusarium solgunluğu mücadeledeinde fidelerin dikimi sırasında ürün, dekar 1000 ml gelecek şekilde can suyu ile birlikte verilir.

Pamuk-Pamukta Fide Kök Çürüklüğü: Tohum tarlaya ekilmeden önce ilaçlanır. Uygulama zamanı ekim zamanıdır. İslatılmış tohumları önerilen doz ve mikardaki bitki koruma ürünü uygulama bidonuna veya selektörde konur. Uygulama bidonu yeknesak bir uygulama yapincaya kadar 40-50 defa çevrilir. Selektörde ise uygulama tertibatının ayarlanması ile yapılır..

Domates (Tarla), Biber (Tarla), -Sebze fidelerinde Çökerten ve Kök Çürüklüğü:

Toprak ilaçlaması ekimden önce ve ekimle birlikte yapılır.

Fide ilaçlaması fideler toprak yüzüne çıktıktan sonra bir veya birden fazla uygulama olabilir. Uygulamalarda m^2 4 litre su ile biber ve domateste 10 ml bitki koruma ürünü kullanılır. 1. uygulamadan 14 gün sonra ikinci uygulama gerçekleştirilir.

26 Mart 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



MOBITAR 35

Tohum ilaçlaması için Akıcı Konsantre (FS)

GRUBU	E2:12	A1:4	FUNGİSİT (Mantar ilaçı)
-------	-------	------	----------------------------

25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-M

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.
Ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekiyorsa oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL (UZEM): 114



KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayın.
- Balıklara zehirlidir. Yer üstü ve yeraltı sularına bulaşmaktan kaçın.
- Doğal su kaynaklarına bulaşmayın.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı Bitki koruma ürününü uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanımasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.



ZEHİR MERKEZİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Yerfistiği - Yerfistiğında kök boğazı çürüklüğü : Tohum ilaçlamasıdır.
İlacın tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir.
Misır-Misırda Tohum ve Kök Çürüklüğü, Fide Yanıklığı
hastalıkları :Ekimden önce tohumlar ilaçlanır ve uygulamadan sonra kısa zamanda ekilmelidir.

Tütün -Tütün fidelerinde Çökerten:

Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır.Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılacak uygulamalar 8-10 gün aralıklarla yinelenebilir.Hastalık görülür görülmez yapılacak uygulamalar şartsızma devresine kadar haftada bir uygulanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

MOBITAR 35 isimli Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E2:12 ve A1:4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, **MOBITAR 35** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayız. Uygulamanın tekrarlanması gerekītī durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E2:12 ve A1:4 harici) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.

20 Mart 2006
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



MOBITAR 35

Tohum ilaçlaması için Akıcı Konsantre (FS)

GRUBU	E2:12	A1:4	FUNGİSİT (Mantar İlacı)

25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-M

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLİK VE DİŞ TİC.AŞ
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt
No:21/26 Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLİK VE DİŞ TİC.AŞ
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısmı 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Platin Kimya
Nüfus Sıralaması ve Dış Ticaret A.Ş.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nüfus Sıralaması ve Dış Ticaret A.Ş." (Nüfus Sıralaması ve Dış Ticaret A.Ş.)

