

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat Tarih ve No.su: 05.09.2012/8836

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANILACAKI BITKİ VE YABANI OTLAR:

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Ot	Uygulama Dozu ve Zamanı	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre	
Ayçiçeği (Çıkış öncesi)	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sırken-İşir Dancan Ballıbabası Yabani hardal Kuş otu Yavşan otu	(<i>Chenopodium album</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Lamium amplexicaule</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Stellaria media</i>) (<i>Veronica hederifolia</i>)	Geniş yapraklı yabancı otlarda: 200 ml/da Dancan otunu: 300 ml/da Ayçiçeği ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	-
Ayçiçeği (Çıkış sonrası)	Sırken-İşir Yabani hardal	(<i>Chenopodium album</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>)	125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 4-6 gerçek yaprak döneminde	45-50 gün
Havuç	Kırmızı köklü tilkikuyruğu Sırken-İşir Yabani semizotu Yegil kirpi dari Yabani hardal Eşek marulu	(<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Portulaca oleracea</i>) (<i>Setaria viridis</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Sonchus arvensis</i>)	150 ml/da Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	-
Nohut	Sırken-İşir Dilikanatır Sarmaşık çobandequeği Küçük turp Yabani hardal	(<i>Chenopodium album</i>) (<i>Galium aparine</i>) (<i>Polygonum convolvulus</i>) (<i>Rapistrum rugosum</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>)	125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	45-50 gün
Mercimek (Çıkış öncesi)	Gönül hardalı Yabani hardal	(<i>Myagrum perfoliatum</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>)	250 ml/da 300 ml/da Mercimek ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	-
Mercimek (Çıkış sonrası)	Yabani hardal Gönül hardalı Sarmaşık çobandequeği	(<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Myagrum perfoliatum</i>) (<i>Polygonum convolvulus</i>)	125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde 150 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	45-50 gün

28 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Platin Kimya

ANACONDA 600

Süsponsiyon Konsantre (SC)

Grubu	F3,13	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-------	-----------------------------

600 g/l Aclonifen

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 15 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu lilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Reflekslerde yavaşlama, idrarda san renk.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Aclonifen

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

- H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
P301+P312 Kendiniyi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anlara zehirlidir. Çileklenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sulanma bulaştırmaktan kaçınınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Boş ürün ambalajını herhangi bir gaye için kullanmayın. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

BULGARIA
SULTAN
SULTAN
Platin Kimya
Mühendislik ve Dış Ticaret A.Ş

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcıları çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Kanıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemeye devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKINESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltıniz. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayıza. Yıkama suyunu ve atılan su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ANACONDA yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerinde (Gökçe, Akçin, San-98, Menemen-92, Damla, Aydın-92, Akdeniz ve Orta Anadolu yerli çeşitleri gibi) güvenle kullanılabilir. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı yerli çeşitlerde (Diyarbakır gibi) fitotoksik olduğundan kullanılmamalıdır. Diğer çeşitlerde kullanmadan önce firmaya danışınız.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

ANACONDA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F3,13 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ANACONDA**'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayıza. Uygulamanın tekrarlanması gereği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F3,13 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.



Süsponsiyon Konsantre (SC)

Grubu	F3,13	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-------	-----------------------------

600 g/l Aclonifen

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze dejmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri yıkınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekiyorsa oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidot yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajda ağızmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tabiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.


RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLİK VE DİŞ TİC.AŞ
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No :21/26
Sanyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLİK VE DİŞ TİC.AŞ
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısm 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75



28 Ocak 2019

TARİK ve ORMAN BAŞKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.