

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su :

KULLANILACAĞI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki	Zararlı organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son uygulama ve hasat arasındaki süre
Çilek	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml / 100 L su nimf, ergin	3 gün
	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)		
Domates	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml / 100 L su nimf, ergin	3 gün
	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus urticae</i>)		
	Tutun beyaz sineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	60 ml / 100 L su larva,nimf	
Karpuz	İki noktalı kırmızı rümcük (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml / da nimf, ergin	3 gün
	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)		
Pamuk	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 ml / da yumurta nimf, ergin	21 gün
	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)		
Karanfil (sera) Sstis bitkisi	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/100 L su Nimf,ergin	3 gün
Hiyar (sera)	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	50 ml/100 L su Nimf,ergin	3 gün
Pathcan	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml / da nimf, ergin	3 gün
	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)		

PlatinKimya

PLARON 240 SC SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	23	İNSEKTİSİT-AKARİSIT (Böcek ve kırmızıörümcek ilaçı)
-------	----	--

240 gr/L Spiromesifen

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayın.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma üründünün uygulanması sırasında hiç
bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayın.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve
hayvan sokmayın.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için,
Tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR

Kullandıran ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar
temiz su koymak iyiçe çalkalayın. Çalkalama suyunu
uygulama tankına boşaltın. Bu işlemi 3 sefer
ekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

İÇİNDEKİLER

Spiromesifen

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

H410 Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanım

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P391 Döküntülerini toplayın

P501 İçeriği/kabını ulusal yönetmeliğe göre bertaraf edin
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Artıra zehirlidir.Çiçeklenme zamanı kullanmayın
Balıklara zehirlidir.Sulara bulaştırmayınız.

Ürünü ambalajında kapaklı olarak muhafaza ediniz.
Boş ürün ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayın,
usulune uygun olarak imha ediniz.

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

-5 °C nin altında ve +35°C nin üstünde depolamayınız

Platin Kimya
Satış, Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.
Sarıhan ARSLAN
Tüm Hizmetlerimiz Sertifikalıdır

09 Mayıs 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Ümit Uğur BAHÇE
Daire Başkan V.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamuk kırmızıörümcekler: mücadele zamanın belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıken kontroller yapılır. Zararlı ya da tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama akdeniz bölgesinde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates, Patlican ve Hıyar kırmızıörümcekler : Domates, patlican ve hıyar da yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates Tütün beyzsineği: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanın alanaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Karpuz kırmızıörümcekler: Sebze bahçelerinde ilk sayılm için çiçeklenme döneminde araziye parşellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızıörümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızıörümcekler büyütçe ile sayılıp kayıt edilir. Toplam kırmızıörümcek sayısı sayılan yaprak adetine bölünür. Bir yaprağa düşen kırmızıörümcek sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğu müraciye devam edilir.

Çilek kırmızıörümcekler:

Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında, çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcek görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

Ümit Uğur BAHÇE
Daire Başkan V.

09 Mayıs 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

PlatinKimya
PLARON 240 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	23	İNSEKTİSİT-AKARİSİT (Böcek ve kırmızıörümcek ilaçı)
-------	----	--

240 gr/L Spiromesifen

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ :

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.
Ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

Ürünle temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekiyorsa oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidot yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL (UZEM) : 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörül (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatası tatbiki veya tavyisiyle uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİCA.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt
No:21/26 Sarıyer /İstanbul
TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİCA.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısim 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı /ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75





SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	23	İNSEKTİSİT-AKARİSİT (Böcek ve kırmızıörümcek ilaçı)
-------	----	--

240 gr/L Spiromesifen

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KIMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş

Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt

No:21/26 Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATİN KIMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısmı 1.Cadde

No: 38 Döşemealtı /ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75



Uğur Bahçeli
Ümit Uğur BAHÇE
Daire Başkan V.

Mevsim içi uygulaması:

Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda açıkta yetişirilen çilek alanlarında yapraklar mevsim başında, (Mart sonu - Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredekilerde görülür. Öncellikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir.

Popülasyonun yaygın göstermesi durumunda tarayı temsil edilecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yapraklı incelenir. yapraklı başına 15 üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılması gereklidir.

Karanfil(Sera) iki noktalı kırmızıörümcek : süs bitkisi ekim alanları sık sık kontrol edilerek, özellikle yaprakların altında kırmızıörümcek aranır. Lokal bulasma tespit edildiğinden ilaçlı mücadele sadece buralarda, sera veya açık alanlarda genelde yaygın bir bulasma rastlandığında tamamı ilaçlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

PLARON 240 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre GRUP 23 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik eder. Bu nedenle, direnç gelişimini engellemek için PLARON 240 SC isimli bitki koruma ürettinin bir sezon içerisinde önerilendে daha fazla uygulamayınız. Uygulanmanın gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (GRUP 23 dışındaki) bitki koruma ürünlerini kullanmaya özen gösteriniz.

KARIŞABILİRLİK DURUMU:

Birçok insektisit, fungisit ve yaprak gübresi ile karışabilir, ancak uygulamadan önce bir ön karışım testi yapılmalıdır.