

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarı No:
Ruhsat tarih ve No.su : 05.03.2013/9130

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasin daki süre
Pamuk	Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	100 ml/da (yumurta, larva, nimf)	--
	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 ml/da (larva, nimf)	
Patlıcan	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus spp</i>)	50 ml /100 L su (yumurta, larva, nimf)	1 gün
Elma	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 ml /100 L su (yumurta, larva, nimf)	7 gün
*Bağ	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml /100 L su (yumurta, larva, nimf)	7gün
Biber (sera)	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus urticae</i>)	100 ml /100 L su (yumurta, larva, nimf)	3 gün
Karpuz	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	125 ml /100 L su (yumurta, larva, nimf)	3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakiler ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 **Platin Kimya**
PLADOX 5 EC

EMULSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	10A	AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı)
		50 g/L Hexythiazox

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız .

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

21 Subat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

İÇİNDEKİLER

Hexythiazox ,ksilen

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321 Özel müdahale gerekli (etiket üzerindeki tıbbi tavsiyeye bakın).

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Arılara ,kuşlara ve balıklara zehirlidir.

Temas ve mide yoluyla etkilidir

Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

Bitki koruma ürünü serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.

Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz

Boş bitki koruma ürün ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız usulüne uygun olarak imha ediniz.


Platin Kimya
Marmaragık ve İyik Ticaret A.Ş.

Yusuf ARSLAN
Zararlılık Uzmanı

PLADOX 5 EC

EMULSIYON KONSANTRE (EC)

GRUP	10A	AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı)
------	-----	------------------------------------

50 g/l Hexythiazox

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.
Ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

Ürünle temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekirse oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ(UZEM) TEL: 114

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta kırmızı örümcek :Tarla kenarında ve içinde yapılan kontrollerde akdeniz bölgesinde 5 birey/yaprak, Ege ve Güneydoğu anadolu bölgesinde 10 birey/ yaprak yoğunluğa ulaştığında kaplama uygulama yapılır.

Bağda iki noktalı kırmızıörümcek : Yapılan sayımlarda 5-8 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.

Elmada Kırmızıörümcek : Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta yapılan sayımlarda 8-10 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.

Patlıcan ve karpuz 'da kırmızıörümcekler : Rastgele seçilen bitkilerde bitkilerde bitkinin alt ve orta yapraklarından dekar başına 10 yaprakta sayım yapılır.Yaprak başına en az 5 adet nimf veya canlı birey bulunduğu uygulama yapılır.

Biber(sera) kırmızıörümcekler : rastgele seçilen bitkilerde bitkilerde bitkinin alt ve orta yapraklarından dekar başına 20 yaprakta sayım yapılır.Yaprak başına en az 3 adet nimf ve canlı birey bulunduğu uygulama yapılır

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :PLADOX 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10A olarak sınıflandırılmış bir akarisitir.

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için PLADOX 5 EC'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Kuvvetli alkali bitki koruma ürünler ile karıştırılarak kullanılmaz . diğer bitki koruma ürünleri ile karışım hazırlamadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veyahatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No :21/26
Sarıyer /İstanbul
TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75



21 Şubat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Platin Kimya
Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş.
Gülne Arslan
Zirai Ürünler