

İmal Tarihi :
Son kullanma Tarihi :

Şarj No :
Ruhsat tarih ve No.su : 04.02.2016 / 10534

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANILACAGI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMƏ ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Mısır	İمام pamuğu (<i>Abutylon theophrasti</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Tarla sarışığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Benecli darıcan (<i>Echinochloa coloanum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yabani banyo (<i>Hibiscus trionum</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yapırgan ot (<i>Sesaria verticillata</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Zincir pitrağı (<i>Xanthium spinosum</i>)	200 ml/da Çıkış sonrası uygulanır	35 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırımı devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmali, uygulamalarda yelpaze hizmetli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günde serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesi ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayıza. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayıza.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Mısırın her döneminde güvenle kullanılabilir ancak en geç uygulama zamanı mısırın 8 yapraklı olduğu dönemdir. Çıkış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisi zayıf kutikula oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk ve nemli son derece kurak hava koşulları, gece gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farklı gibi nedenlerden dolayı oluşan stres koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir. Ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz.

Platin Kimya

STMELL

Süsپansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	F2,27	B,2	HERBİSİT (Yabaner Ot İlacı)
-------	-------	-----	--------------------------------

75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron

Önce Etiketi Okuyunuz.

Evide Kullanmayın.

Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.

Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Vemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayın.

Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 GÜN İnsan Ve Hayvan Sokmayın.

İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozdakullanın.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DISINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan Ürünün Boş Ambalajlarının İçine 1/4'üne Kadar Temiz Su Koyarak İyice Çalkalayınız. Çalkalaması Suyunu İlaçlama Tankına Boşaltınız. Bu İşlemi 3 Sefer Tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MUDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

17 FEB 2019

Net Miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Mesotrione ; Nicosulfuron

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayın.

- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayın.

- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.

- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayıza.

Platin Kimya
Neurotoksilik Dış Ticaret A.Ş.
BÜLENT AKSLAN
Ziraat Mühendisi

geli ~

STMELL, mısır tarlalarında dar ve geniş yapraklı yabancı otları başarıyla kontrol eden, "mesotrione ve nicosulfuron" etkili maddelerini süspansiyon konsantrه formülasyonunda ihtiya eden seçici bir yabancı ot ilaçıdır. **STMELL**, esas itibarıyle yeşil aksamdan (yaprak, gövde) almır, bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem, hem de floemde) sūratle taşınır.

DİKKAT: Uygulama esnasında ürünün rüzgar ile çevredeki şeker pancarı, bakla, sebze, bağ ve meye alanlarına taşınması engellenmelidir. **STMELL**, sadece yemeklik mısırda kullanılmak üzere geliştirilen özel bir yabancı ot ilaçıdır. Tohumlu olarak üretilen mısırarda, tatlı mısır ve patlamalı (popcorn) mısır çeşitlerinde kullanılmaz. Organik fosforlu bir toprak ilaçının kullanıldığı durumlarda uygulanmamahdır. Yaprak gübreleri ve sıvı gübrelerle karıştırılmamalıdır. Diğer sulfonylurea'h bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalı ve bu grup bileşiklerle ardışık uygulamalardan kaçınılmalıdır. Yeni ilaçlanmış alanlara oflatma için hayvan sokulmamalı, bu alanlardan ot alınmamalıdır.

Münavebe ve Tekrar Ekim: Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise ardından tekrar mısır ekilebilir. Bu durumda çıkıştan sonra mısır bitkisinde çok az da olsa bazı geçici etkiler görülebilir. Bu nedenle ekim öncesi toprak sürümlü tavsiye edilmelidir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kişlik buğday ve arpa ekilebilir. Şeker pancarı ve ayçiçeği gibi hassas bitkilerde bekleme süresine ve toprağın yağmur almasına özen gösterilmelidir.

DİKKAT: Şeker pancarı, bezelye ve bakla ekimi, **STMELL** uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şeker pancarı ve sebzeler ekilemez. Yabancı otlar ve mısır ıslak iken ilaçlama yapılmamalıdır.

Bitki Tahammülü: Tavsiyelere uygun kullanıldığında **STMELL** mısır tarlalarında iyi tolere edilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ: **STMELL** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup **F2,27;B,2** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **STMELL**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gereği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup F2,27;B,2** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABILIRLİK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışma gerçek duyuluyorsa, ön karışım testi yapılması önerilir.



Süspsiyon Konsantrه (SC)

Grubu	F2,27	B,2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	--------------	------------	---------------------------------------

75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

Yutulması halinde: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde: Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde: İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde: Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerçekiyorsa oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Spesifik bir antidot yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ TEL (UZEM) : 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TİDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

17 Haziran 2019

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMА BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No:21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısim 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

