

İmal Tarihi :

Son kullanma Tarihi :

Şarj No :

Ruhsat Tarih ve No.su : 12.03.2015/10143

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OT	UYGULAMA DOZU
Mısır	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Yabani jüt (<i>Corchorus olitorius</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yer fesleğeni (<i>Mercurialis annua</i>) Kirpi darı (<i>Setaria spp.</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Yabani fiğ (<i>Vicia spp.</i>)	5 g/da + DROND 90 (yayıcı yapıştırıcı) 25 ml/da
Domates	Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kirpi darı (<i>Setaria spp.</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	5 g/da + DROND 90 (yayıcı yapıştırıcı) 25 ml/da

Şeker mısırdaki fitotoksik olduğundan kullanılmaz.

Tohum üretimi için ekilen mısır tarlalarında kullanılmaz

DONCEP mutlaka beraberinde verilen DROND 90 (yayıcı yapıştırıcı) ile kullanılmalıdır. Dozu dekara 25 ml'dir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinenin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

28 Ocak 2019
TARİHİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

PlatinKimya

DONCEP SUDA ÇÖZÜNEBİLİR GRANUL (SG)

GRUBU	B,2	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	--------------------------------

%25 Rimsulfuron

- Önce etiketi okuyunuz
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.



Net Miktarı :

Brüt Ağırlığı :

Perakende Satış Fiyatı (K.D.V Dahil):

İÇİNDEKİLER

Rimsulfuron

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR

DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayınız.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

DEPOLAMA VE ATIKLARIN İMHASI

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız
- Balıklar için zehirlidir, yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Depolama ve atıkların imhası sırasında su, gıda maddeleri ve yemlere bulaştırmayınız.
- Gübre, insektisit, fungusit ve tohumlardan ayrı yerde depolayınız
- Ambalajı yeniden kullanmayınız.
- Aşağıdaki hususlara dikkat edilmezse, ağaçlara veya kültür bitkilerine zarar verebilir. Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya ilacın taşınarak veya yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz. İlaçlama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz.



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Mısır: En iyi netice **DONCEP** yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı ya da 5-10 cm çap veya yükseklikte) kullanılmalıdır.(Sorghum halepense-kanyaş-geliç) gibi rizomdan çoğalan çok yıllık yabancı otların kontrolü için uygulama yabancı otun kardeşlenme döneminde yapılmalıdır. İlaçlama esnasında mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır, mısırın daha sonraki dönemlerindeki uygulamalarda fitotoksite görülebilir. En iyi netice için ilaçlamadan sonra 4 saat boyunca yağış olmaması gerekir.

Önemlidir.

-**DONCEP şeker** mısırında ve tohumluk üretimi yetiştiriciliğinde (ana-baba hatlarında) kullanılmamalıdır.

-**DONCEP Mısır** ekimi sırasında ya da sıra arası toprak işleme sırasında sistemik organik fosforlu insektisitlerin kullanıldığı tarlarda uygulanmamalıdır.

-Organik fosforlu bir insektisit ile mısırdaki yapraklardan uygulama yapıldıysa 7 gün içinde **DONCEP** kullanılmamalıdır.

-Mısırdaki **DONCEP** kullanıldıktan sonraki 4 günde içinde organik insektisitler uygulanmamalıdır.

-Yüksek hava sıcaklığı bazı hassas mısır çeşitlerinde geçici bir fitotoksitenin ortaya çıkmasına neden olabilir bu sebeple ilaçlamanın akşamüzeri yapılması önerilmektedir.

Domates:

DONCEP tohumdan yetiştirilen domateslerde bitkiler 2-3 yaprağa ulaştıktan sonra yada şaşırtılarak yetiştirilen domates tarlarında bitkiler şaşırtma şokunu atlattıktan ve yeni büyümler başladıktan sonra yabancı otların erken büyüme dönemlerinde uygulanır.

Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden **DONCEP** i anormal hava şartları, kuraklık nedeni ile başkaya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış mısır veya domates bitkilerine tatbik etmeyiniz.

Aynı yerde, aynı etki mekanizmasına sahip herbisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı yabancı ot türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta herbisitlerin tavsiye edilen dozları ile bu yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanmaz.

Başka etki mekanizmasına sahip herbisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür herbisitlerle tank karışımı yapılması ayrıca toprak işleme gibi kültürel işlemler yabancı otların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller. Sezon içinde aynı yerde birden fazla **DONCEP** uygulaması yapmayınız.

 **PlatinKimya**
DONCEP

SUDA ÇÖZÜNEBİLİR GRANUL (SG)

GRUBU	B,2	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	--------------------------------

%25 Rimsulfuron

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Ağızdan alınması halinde; Yutulması halinde doktora başvurunuz. 1-2 bardak su içiniz, kusturmaya çalışmayınız. Bilinçsiz hastaya ağızdan bir şey vermeyiniz.

Göz ile temas halinde; Göz ile teması halinde en az 15 dakika bol temiz su ile yıkayınız.

Deri ile temas halinde; İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız. İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. Elbiseleri tekrar kullanmadan önce mutlaka yıkayınız.

Solunması halinde; Hastayı açık havaya çıkarınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ(UZEM):TEL: 114

**DEPOLAMA DURUMU**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ilaçlarının kalitesini garanti eder. Firma ilaçlarının depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde meydana gelecek zarar için sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TIC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TIC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75


Platin Kimya
Müesseslik ve Dış Ticaret A.Ş.
NURİA ARSLAN
Genel Müdürü

28 Ocak 2019

TARİHİ ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

 

ETKİ ŞEKLİ

Diğer Sulfonylurea'larda olduğu gibi etki yeri acetolactate enzimi sentezidir. Bu enzime temel protein bloklarından valine ve isoleucine'in yapımında ihtiyaç vardır.

İnhibasyon sonucunda büyüme derhal durur ve sonuçta bitki ölür. Bu enzimin insan ve hayvanlarda bulunmayışı, DONCEP'in düşük toksisitesini açıklamaya yardım etmektedir. Duyarlı bitki türlerinde (Amaranthus retroflexus'ta olduğu gibi) DONCEP aktivitesinin ilk belirtileri meristematik dokuda görülür. Bu bitkilerde DONCEP uygulamasından sonra büyüme derhal durur.

Kloroz, nekrozis ve yapraklarda şekil bozuklukları gibi diğer belirtiler birkaç gün daha geç görülür. Otlar 10 ile 25 gün içinde ölür.

FİTOKTOKSİTE: DONCEP tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir.

ÜRÜN MÜNAVEBESİ:

DONCEP'in toprakta kalıcılığı kısadır. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır ve domatesten sora normal ekim münavebesine giren her türlü kültür bitkisi ekilebilir.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ: DONCEP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DONCEP'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B,2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa, ön karışım testi yapılması önerilir.

 **PlatinKimya**
DONCEP

SUDA ÇÖZÜNEBİLİR GRANUL (SG)

GRUBU	B,2	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	--------------------------------

%25 Rimsulfuron

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

 **Platin Kimya**
Müessesillik ve Dış Ticaret A.Ş.

Suna ARSLAN
Zararlı Bilimci

28 Ocak 2019

TARİHİ ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.