

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO'SU : 06.02.2006/5384
KULLANILACĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ |
|---|---|---|
| AYÇİÇEĞİ, SOĞAN, PAMUK, PATATES | Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) | Ekim öncesi 500 ml/da Çıkış öncesi 500 ml/da |
| | Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>) | |
| | Farekulağı (<i>Aragallis arvensis</i>) | |
| | Rüzgar otu (<i>Apera spica-venti</i>) | |
| | Kara pazı (<i>Atriplex patula</i>) | |
| | Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) | |
| | Sirken (<i>Chenopodium album</i>) | |
| | Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) | |
| | Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) | |
| | Đarıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) | |
| | Sütleğen (<i>Euphorbia spp.</i>) | |
| | Boz ot (<i>Heliotropium europaeum</i>) | |
| | Balıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) | |
| | Papatya (<i>Matricaria spp.</i>) | |
| | Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) | |
| | Yabani semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) | |
| | Çobandeğneği (<i>Polygonum spp.</i>) | |
| | Çayır salkım otu (<i>Poa pratensis</i>) | |
| | Kirpi darı (<i>Setaria spp.</i>) | |
| | Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) | |
| Bülbül otu (<i>Sisymbrium officinale</i>) | | |
| Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) | | |
| Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) ✓ | | |
| Tarla akça çiçeği (<i>Thlaspi arvense</i>) | | |
| İsrgan otu (<i>Urtica urens</i>) ✓ | | |
| MISIR, DOMATES | Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>) | Dikim öncesi 500 ml/da |
| | Sirken (<i>Chenopodium album</i>) | |
| | Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) | |
| | Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) | |
| | Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) | |
| | Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) | |
| Yabani semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) | | |

Çok kumlu topraklara yetişen bitkilerde kullanmayınız.

Yıllık dar yapraklı ve geniş yapraklı yabancı otları çirilenme sırasında kontrol eden bir herbisittir. Çıkmış otları kontrol etmez. Kültür bitkileri çeşidine göre ekim öncesi ve çıkış sonrası uygulanabilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

25 Eylül 2020

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd.)

cansa

PIYAMBO

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

| | | |
|-------|------|--------------------------------|
| GRUBU | K1,3 | HERBİSİT (YABANCI OT İLACI) |
|-------|------|--------------------------------|

330 g/l Pendimethalin

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJIN ¼'Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Gözlerde ve deride tahriş, ateş.



NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE
SATIŞ FİYATI (K.D.V.DAHLİL) :

İÇİNDEKİLER:

Pendimethalin, anyonik/noniyonik karışım

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226:Alevlenir sıvı ve buhar.

H315:Cilt tahrişine yol açar.

H317:Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318:Ciddi göz hasarına yol açar

H410:Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P210:İsıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P303 + P361 + P353:DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE

İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P312:Kendinizi iyi hissetmezseniz: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P273:Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P362:Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayınız.

P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

EUH401:İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyunuz.

Sabahattin SAHAN
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzaklı Kimya San. O.Ş.İ. Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 202 001 2827
Sermayesi: 3.100.000 TL.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamuk ve Ayçiçeği: En iyi sonuç ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanması ile elde edilir, ekim öncesi tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırma zorunlu değildir. Pamukta bir diğer uygulama şekli, ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulamadır.

Patates ve Mısır: Ekim sonrası, çıkış öncesi (pre-emergens olarak) toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır.

Soğan: Çıkış öncesi (pre-emergens) kullanılabilir gibi, soğan bitkilerinin 2 gerçek yapraklı döneminden sonra da kullanılabilir.

Domates: Fideler, uygulamadan sonra 2-6 gün içerisinde dikilmelidir. Fide dikimi sırasında bitki koruma ürünüyle bulaşık toprak tabakasının köklere temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Kurak şartlarda PİYAMBO uygulamasını takip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

Uygulamadan sonra ekilebilecek bitkiler;

Hemen: Pamuk, fasulye, bezelye, mısır, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler

6 ay sonra: Diğer bitkiler

Herhangi bir sebeple bitki koruma ürünü uygulanan tarla bozulduğunda;

Toprak 15 cm işlenerek: Buğday, arpa, mısır, pamuk, patates, fasulye, soya ve bezelye

Toprak işlenmeden: Mısır, fasulye ve bezelye

DİRENÇ YÖNETİMİ:

PİYAMBO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K1,3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **PİYAMBO**'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K1,3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU :

Gerekirse Glyphosate'li bitki koruma ürünleriyle karıştırılarak kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

PİYAMBO

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

| | | |
|-------|------|--------------------------------|
| GRUBU | K1,3 | HERBİSİT (YABANCI OT İLACI) |
|-------|------|--------------------------------|

330 g/l Pendimethalin

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile teması halinde: 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurunuz. İlaç etiket ve ambalajını birlikte götürünüz..

Yutulması halinde: Kusturmayınız. Bilinci kapalı olan hastaya ağızdan bir şey vermeyin ve kusturmayınız. Doktora başvurunuz. İlaç etiket ve ambalajını birlikte götürünüz.

Cilt ile temas halinde: Elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Solunması halinde: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114


Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- * Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırılmamalıdır.
- * Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- * Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- * Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.
- * Tavsiye edilen ekim derinliklerine titizlikle uyulmalıdır.
- * Bitki koruma ürününden en iyi sonucu alabilmek için toprak rutubeti şarttır.
- * % 10 dan fazla organik madde içeren topraklarda yabancıot kontrolünde azalma olabilir.
- * Hastalık, kuraklık, aşırı bitki koruma ürünü uygulaması yetersiz toprak hazırlığı gibi nedenlerden ötürü zayıf ve stresli durumda olan bitkilerde kullanılmamalıdır.
- * Uygulama düzgün yapılmamışsa veya toprağa karıştırma işlemi tavsiye edilenden daha derine yapılmış ise, yabancıot kontrolünü azaltır veya bitkiye zarar verir.
- * Uygulamadan sonra makinayı temizleyiniz.
- * Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- * Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firmamız ilaçlarının kalitesini ve spesifikasyonuna uygunluğunu garanti ederler. Firma ilacın yanlış kullanımından ve ilacın uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr

Sabahattin ŞAHAN
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. O.S.B. Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 202 001 2827
Sermayesi: 3.100.000 TL.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

25 Eylül 2020