

İmal Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

Sarj No:

Ruhsat tarih ve No.su : 06.07.2012/8775

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasında ki Sure
Pamuk	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>) Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>) Yaprak pireleri (<i>Asymmetrasca decedens</i> , <i>Empoasca decipiens</i>)	40 gr/da (nimf,ergin) 10 gr/da (larva-ergin) 10 gr/da (nimf,ergin)	-----
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	6 gr/da (larva-ergin)	7 gün
Domates (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 gr/100 L su (larva-ergin)	3 gün
Domates (Tarla)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 gr/da (larva-ergin)	3 gün
Antepfıstığı	Antepfıstığı psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	20 gr/100 L su (ergin-nimf)	7 gün
Elma	Elma yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>)	20 gr/100 L su (ergin-nimf)	14 gün
Karpuz	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	25 g/da (ergin,nimf)	7 gün
Biber (Sera)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	25 g/100 L su (ergin,nimf)	3 gün
Hıyar (sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 gr/100 L su (larva--ergin)	3 gün
Patlıcan (sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 gr/100 L su (larva-pupa-ergin)	1 gün



EFFORE 20 SP
SUDA ÇÖZÜNEN TOZ (SP)

GRUP	4 A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	-----	-----------------------------

% 20 Acetamiprid

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayınız

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Hareketlerde uyusukluk, adale kasılmaları, denge bozukluğu, Solunum azalışı, gözyaşı ve sümük artışı vb.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL (UZEM) : 114

Net Miktarı :

Brüt Ağırlığı :

Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

İÇİNDEKİLER

Acetamiprid

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız

P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanınız.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayınız.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Arılara zehirlidir.Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

-Balıklara zehirlidir.Sulara bulaştırmayınız.

-Ürünü ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.

-Bitki koruma ürününü serin,kuru ve iyi havalabilen yerlerde muhafaza ediniz.

-Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

- Boş ürünün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

17 Mart 2020
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



ÖZELLİKLERİ : EFFORE 20 SP sistemik etkilidir.Uygulamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer ve etkisini 14 ile 21 gün korur.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:Uygulama öncesi uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır.Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır.Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta tütün beyazsineği : İlk uygulama ekonomik zarar eşliğinde, ikinci uygulama birinciden 7- 10 gün sonra, üçüncü uygulama da popülasyonun durumu izlenerek,ikinci uygulamadan 11 - 15 gün sonra yapılmalıdır.

Pamuk yaprakpirelerine karşı rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt,orta ve üst kısımdan alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprak pireleri sayılır.Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı tespit edilir.Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpisi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamuk yaprakbiti: Tarla kontrollerinde yaprakbiti ve birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulanma ertelenmelidir. Fide döneminde seyretmeden sonra %50 bulaşık fide tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

Patateste Patates böceği: Örneklem için, tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir.Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılışının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de , böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden, uygulama gerekmez.



**EFFORE 20 SP
SUDA ÇÖZÜNEN TOZ (SP)**

GRUP	4 A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	-----	-----------------------------

% 20 Acetamiprid

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.Ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyse oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur.Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL (UZEM) : 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Sarıyer /İstanbul
Tel : (0 212) 346 0777 (pbx) Fax : (0212) 3460778

ÜRETİM TESİSİ :

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No : 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Platin Kimya
Müessesillik ve Dış Ticaret A.Ş.
Suna ARSLAN
Ziraat Mühendisi

17 Mart 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Elmada yaprakbiti: Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15'inde bulaşıklık olursa uygulama yapılmalıdır.

- Uygulamalar sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır.
- Uygulamalar yapıldıktan sonra 6 saat içerisinde yağmur yağarsa uygulama tekrarlanır.

Antepfıstığı psillidine karşı: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka(fimajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Karpuz ve biberde şeftali yaprakbitine karşı:Tarlayı temsil eden 20-40 yapraktan ortalama bir yaprağın 10-20 adet yaprakbiti görüldüğüne uygulamaya başlanır.

Domates (sera) ,Hıyar (sera) ve patlıcan (sera) Tütün Beyazsineği: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :EFFORE 20 SP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4 A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için EFFORE 20 SP 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (grup 4 Aharici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali özelliktekiler hariç,diğer insektisit,fungisit ve yaprak gübrelere ile karıştırılarak uygulanabilir .Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım hazırlamadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



EFFORE 20 SP SUDA ÇÖZÜNEN TOZ (SP)

GRUP	4 A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------------	------------	-------------------------------------

% 20 Acetamiprid

RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Sarıyer /İstanbul

Tel : (0 212) 346 0777 (pbx) Fax : (0212) 3460778

ÜRETİM TESİSİ

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No : 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Suna ARSLAN
Ziraiat Mühendisi
Platin Kimya
Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş.

17 Mart 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.