

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :

Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su : 03.04.2019 / 11353

KULLANILACAĞI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Domates	Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	150 ml/100 L su (3 litre /m ² mahlul)	7 gün
Tütün	Çökerten (<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	200 ml/100 L su (3 litre/m ² mahlul)	---
Biber (Sera)	Toprak kökenli hastalık etmenleri (<i>Pythium spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i>)	500 ml/da (damlama sulama ile)	3 gün
Hiyar	Kabakgillerde solgunluk ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>)	300 ml/100 L su (3 lt/m ² mahlul)	7 gün
Muz	Toprak kökenli hastalık etmenleri (<i>Fusarium oxysporum f.sp. cubense</i>)	750 ml/ da (damlama sulama ile)	---

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesi uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günde serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

03 - 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

03 Nisan 2019



LARIS TARIM

LABENTI 36 SL

Suda Çözünen Konsantre(SL)

GRUBU	A3:32	FUNGİSİT (Mantar ilaçı)
		360 g/L Hymexazol

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayın.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayın.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayın. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltın. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayın.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL: UZEM 114

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :
İÇİNDEKİLER
Hymexazol, Sodyum hidroksit
ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimini arayın.
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimini arayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın

Hakan AYDOĞAR
Ziraat Mühendisi

LARIS TARIM
LARIS TARIM ÜRÜNLERİ
ITH VE TIC. LTD. ŞTİ

ILAÇLAMA MAKASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Süzgeçli kova ile uygulama : Tohumlar ekildikten hemen sonar m²ye 3 litre karışım (mahlül) gelecek şekilde süzgeçli kova veya ilaçlama makinası ile toprak yüzeyine uygulama yapılır.

Biberde damlama sulama ile uygulama : Dekara hesaplanan bitki koruma ürünü miktarı,damlama sulama ünitesi 10 dakika çalıştırılarak,damlama sulama ile toprağa verilir.1.uygulama dikimden 1 gün sonra,2.uygulama birinci uygulamadan 30 gün sonra yapılır.

Muzda uygulama : Dikim sonrası dekara 750 ml.bitki koruma ürünü uygun bir yöntemle (damlama sulama) toprağa verilir.Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra kimyasal mücadele etkili değildir.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ : LABENTI 36 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A3:32 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için **LABENTI 36 SL** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayıınız.Uygulamanın tekrarlanması gereği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (grup A3:32 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABILIRLIK DURUMU :

Diger bitki koruma ürünlerile karıştırılmadan ön karışım denemesi yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

03 Nisan 2019



LARIS TARIM

LABENTI 36 SL

Suda Çözünen Konsantre(SL)

GRUP	A3:32	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
------	-------	----------------------------

360 g/L Hymexazol

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.
İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyorsa oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Bilinen bir antidotu yokturBelirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL: UZEM 114

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Arılara zehirlidir.Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
Balıklara zehirlidir.Sulara bulaştırmayınız.

Bitki koruma ürününü serin,kuru ve iyi havalandabilen yerlerde muhafaza ediniz.

Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.Bitki koruma ürünü kendi ambalajında ağızı kapalı olarak saklayınız.

Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörülü(tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FIRMA :

PLATİN KİMYA MÜM. VE DIŞ TİC. A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısim 1.Cadde
No : 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

RUHSAT SAHİBİ FIRMA :

LARIS TARIM ÜRÜNLERİ İTH. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Ahı Evran Cd.Polaris Plaza No:1/25 Kat:4
34398 Maslak /İSTANBUL-TURKEY
Tel No. 0 212 346 10 67
Fax No. 0 212 346 10 63

Hakan AYDOĞAR
Ziraat Mühendisi

