

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su : 24.07.2014/9757

Özellikleri ve etki şekli :

Emamectin benzoate,yapraklarda beslenen Lepidoptera larvalarına yüksek derecede etkili olup larvalarda sinir uyarılarını bloke eder.Bu durumda,larvaların beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar.Maksimum larva ölümleri dört gün içinde gerçekleşir.**PANCART 5 SG**,güçlü bir mide zehiri olup kontak etkiye de sahiptir.Organik fosforlu pretroidler ve IGR'lara dayanıklılık kazanmış zararlılara da etkilidir.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Biber (Tarla)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/ da (Larva)	7 gün
Biber (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/ da (Larva)	7 gün
Domates (Sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 g/100 L su (Larva)	7 gün
Domates (Tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 g/100 L su (Larva)	7 gün
Hıyar (sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/100 L su (Larva)	7 gün
*Bağ	Bağ salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	25 ml/100 L su (Larva)	7 gün
Patlıcan (sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/100 L su (Larva)	7 gün
Karanfil (kesme)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/100 L su (Larva)	-----
Karanfil	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 g/100 lt su (Larva)	-----
Elma	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	40 g/100 lt su (Larva)	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz



PANCART 5 SG

Suda Eriyebilir Granül (SG)

GRUP	6	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	---	-----------------------------

%5 Emamectin benzoate

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız .

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Göz bebeklerinde büyüme,kasların kontrolsüz hareketi ,Kas titremesi,

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL : 114

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :
İÇİNDEKİLER
Emamectin Benzoate
ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın

P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.

Balıklara zehirlidir.Yer üstü ve yeraltı sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

Bitki koruma ürünün ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız.

Rüzgarla sürüklenmenin olabileceği havalarda kullanmayın.

Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı/V.

18 Mart 2020
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Mustafa ARSLAN
Ziraat Mühendisi
Platin Kimya
Ticari ve Endüstriyel Ticaret A.Ş.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır.Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır.Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Biber,Patlıcan,Hıyarda yaprakkurduna karşı:Köşegenler yönünde yürüyerek,100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir.Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Domateste yeşilkurta karşı : Tarlaya köşegenler yönünden girilip tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek,yaprak,sap,meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır.100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Bağda salkım güvesine karşı: Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir.Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış düşmeye başlamalı,etikili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir.Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece,, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı asmanın fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır.İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir.Her dölde bir uygulama yapılır.

Karanfilde pamuk yaprakkurduna ve yeşilkurda karşı : Üç metre uzunluğundaki bir sırada 5-6 adet larva veya 1 yumurta paketi bulunduğu mücadele geçilmelidir.Uygulamadan iyi bir sonuç alabilmek için 1-3.dönem larvalara karşı yapılmalıdır.İlerki dönemdeki larvalara karşı yapılan uygulamalardan yeterli sonuç beklenmez.



PANCART 5 SG

Suda Eriyebilir Granül (SG)

GRUP	6	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	---	-----------------------------

%5 Emamectin benzoate

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Yutulması halinde

Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. Ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz. Hastayı kusturmaya çalışmayınız.

Göz ile temas halinde

Göz ile temas halinde göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

İlaç ile temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız.

Solunması halinde

Hastayı temiz havaya çıkarınız. Sıcak ve sakın tutunuz. Nefes almıyorsa suni teneffüs yapınız.Doktor çağırınız.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur.Belirtilere göre tedavi uygulanır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75


Platin Kimya
Müessesilik ve Dış Ticaret A.Ş.
Suna ARSLAN
Ziraat Mühendisi


Dr. Feriye ARSLAN
Genel Müdür Yardımcısı V.

18 Mart 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

A N

Elmada Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yapılır. Elma içkurdü mücadelesinde hedef, her dölle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir

Bitki tahammülü :Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında,tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür.Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ : **PANCART 5 SG** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 olarak sınıflandırılmış bir akariisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için **PANCART 5 SG** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (grup 6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Büyük miktarlarda karışım yapılmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir..



PANCART 5 SG

Suda Eriyebilir Granül (SG)

GRUP	6	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	---	-----------------------------

%5 Emamectin benzoate

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75



18 Mart 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Suna ARSLAN
Ziraat Mühendisi

Platin Kimya
Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş.

AN