

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Satır No:
Rühsat tarih ve No.su : 17.05.2013/9217

KULLANILACAKI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 g/ 100 L su (nimf,ergin)	3 gün
	Pas akarı (<i>Aculops lycopersici</i>)	75 g/ 100 L su (larva,ergin)	3 gün
Elma	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 g/ 100 L su (larva,ergin,nimf)	21 gün
	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 g/ 100 L su (larva,ergin,nimf)	21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesi uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günde serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKINASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 PlatinKimya
SYDABEN 20 WP

İslanabilir Toz (WP)

GRUP	21A	AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı)
		%20 Pyridaben

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayın.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayın.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayın.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :
İÇİNDEKİLER

Pyridaben

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H331 Solunması halinde toksiktir.
H301 Yutulması halinde toksiktir.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
P304+P340 SOLUNDUGUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Arılar zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayın.
Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
Ürünü ambalajında kapaklı olarak muhafaza ediniz.
Ürtin ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız.
Rüzgarla sürüklenebileceği havalarda kullanmayın.
Boş ürün ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayın,
usulune uygun olarak imha ediniz.



ULUSAL ZEHİR MERKEZİ(UZEM) TEL: 114

13 Şubat 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.


Süleyman ARSLAN
Platin Kimya
Zemin Mühendislik ve Diş Ticaret AŞ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Domates(sera) -Tütün Beyaz sineği: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır

Domates(sera) pas akarı : Bitkilerin özellikle toprağa yakın kısımları incelenerek pas rengini alan bitkilerden Yaprak örnekleri alınır.yapraklar stereo binoküler mikroskop altında incelenerek zararlı aranır.Zararının görüldüğü bitkiler ve çevresinde lokal uygulama yapılır.İki ve üç gün aralıklarla bitkiler incelenir ve yayılma olması halinde tüm tarla ilaçlanır.

Elma-iki noktalı kırmızıörümcek ve Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yapraka periyodik olarak yapılacak sayımlardaiki noktalı kırmızıörümcek ve Avrupa kırmızı örümceği sayısının yaprak başına ortalama 8-10 adet birey geçmesi dudumunda ilaçlama yapmak gereklidir.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :SYDABEN 20 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 21A olarak sınıflandırılmış bir akarisiittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçitirmek için **SYDABEN 20 WP** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (grup 21A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABILIRLİK DURUMU :

Bordo bulmacı ile karıştırılmaz ,ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım hazırlamadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir



SYDABEN 20 WP

İslanabilir Toz (WP)

GRUP	21A	AKARİSİT (Kırmızıörümcek İlacı)
	%20 Pyridaben	

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.
Ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze dejmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.
Deri ile temas halinde

Ürünle temas eden vücut kısımlarını bol sabunu
su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyorsa oksijen
veriniz suni solunum yapınız.Doktor çağırınız

ANTİDİOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidot yoktur.Belirtilere göre tedavi
uygulanır

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ(UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında,
açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans)
sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma
ürünün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma
ürünün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya
tavsiyelere uymadıklarında eksikslik neticesinde doğacak
olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No:21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısim 1.Cadde
No: 38 Dösemalı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75



13 Şubat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

BB N