

İmal Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

Sarj No:

Ruhsat tarih ve No.su : 31.01.2014/9491

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Yeşil kurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	45 ml / da larva	14 gün
	Yaprak kurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	40 ml / da larva	14 gün
Fındık	Fındık kurdu (<i>Curculio nucum</i>)	45 ml / da ergin	14 gün
Elma	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	35 ml / 100 L larva	14 gün
Domates (sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	40 ml/100 L larva	3 gün
Biber (sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	40 ml/100 L larva	3 gün

GENEL BİLGİLER :


TUNCH 150 EC emülsiyon konsantre formülasyonunda pamuk ve ,fındık, zararlılarla mücadelede kullanılan mide ve değme etkili bir insektisittir.Zararlı larvalarının her döneminde ve fındık kurdu zararlısının erginine etkilidir.

TUNCH 150 EC böceklerde sinir hücrelerinde sinir hücrelerinde sodyum kanalları tıkayarak etki eder ve ilaçlamadan çok kısa bir süre sonra zararlıların beslenme ve diğer faaliyetleri durur veya çok azalır.24 ile 60 saat içinde de zararlılar ölür.

TUNCH 150 EC uygulamadan sonra bitki üzerinde bitki koruma ürünü kurumasından sonra m²'ye80 mm ,ye kadar yağın yağışlardan etkilenmez,ilaçlamayı tekrarlamaya gerek kalmaz

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

 **PlatinKimya**

TUNCH 150 EC
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	22A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	-----	-----------------------------

150 g/L Indoxacarb

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Yutulduğunda ve solunduğunda tehlikelidir. Cilde temas halinde hassasiyet yaratabilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL (UZEM) : 114

Net Miktarı :

Brüt Ağırlığı :

Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

İÇİNDEKİLER

Indoxacarb , Cyclohexanone,ksilen

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

H270 Yangına yol açabilir veya yangını şiddetlendirebilir; oksitleyici.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Arılara zehirlidir.Çiçeklenmedönemi kullanmayınız.

Bahıklara zehirlidir.Yer üstü ve yeraltı sularına bulaştırmaktan kaçınız.

Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

Bitki koruma ürünün ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız.

Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz.



05 Kasım 2020
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



KALİBRASYON:

Uygulama öncesi uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır.Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır.Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak,tarak,çek kozaları kontrol edilir.Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Fındık kurduna karşı: meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2'den fazla fındık kurudu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Elma içkurduna yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir.Elma içkurdu mücadelesinde hedef,her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Domates (sera) ve biber(sera) yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip,tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek,bitkinin çiçek,yaprak,sap,meyve ve sürgünlerinde,yumurta ve larva aranır.100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

TUNCH 150 EC ile sezon içinde aynı yerde Sezon içinde fındık ta 1 den fazla uygulama yapmayınız.Uygulama traktörle çekilen hidrolik ilaçlama aleti veya sırt pülverizatörü ile yapılabilir.

 PlatinKimya

TUNCH 150 EC EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	22A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	-----	-----------------------------

150 g/L Indoxacarb

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Soluma ;Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Yutma ;Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün.

Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Ciltle Temas ;Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su ve sabunla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas ;Kontakt lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL (UZEM) : 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında,açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel,kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü(tolerans)sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklikneticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

 Platin Kimya
Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş.
Yunus ARSLAN
Ziraat Mühendisi


Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı

05 Kasım 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TUNCH 150 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 22A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini geciktirmek için **TUNCH 150 EC'nin** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulama tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 22A hariç)bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etiketeki önerileri mutlaka dikkate alınız.

Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.**TUNCH 150 EC** 'nin etkili maddesi İndoxacarb yeni ve farklı bir etki şekline sahip olduğu için böcekleri dayanıklılık kazandığı alanlarda bu ilacın uygulanması, dayanıklılığı geciktirmek yada engellemek için çok uygundur. Gerektiği durumlarda **TUNCH 150 EC** yi farklı etki mekanizması olan karbamat, sentetik piretroid, organik fosforlular ya da acyl urea grubundan insektisitlerle değişimli olarak kullanınız. Zararlı yoğunluğunu izleyerek zararlılar ekonomik zarar seviyesine ulaştığında ilaçlama yapınız. Yoğunluk fazlaysa zararlıların bir dölü için birden fazla ilaçlama yapılması gerekebilir. **TUNCH 150 EC** uygulamaları için daima etiketteki doz, ilaçlama aralığı ve zamanlama ile ilgili tavsiyelere uyunuz. **TUNCH 150 EC** etkili maddesi İndoxacarb'ın pek çok yararlı böceklere yüksek derecede seçici olması, zararlıların baskı altında tutulmasında avantajlı bir durum yaratacak aynı zamanda bu Zararlıların ilaçlara karşı dayanıklılık kazanmasının engellenmesinde yarar sağlayacaktır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Büyük miktarlarda karışım yapılmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 **PlatinKimya**
TUNCH 150 EC
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	22A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	-----	-----------------------------

150 g/L Indoxacarb

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:


PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75


Dr. Yunus AYRAM
Genel Müdür Yardımcısı

05 Kasım 2020
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

A 2