

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarı No:
Ruhsat tarih ve No su : 17.02.2014/9502

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut	Armut kaplıcı (<i>Stephanitis pyri</i>) Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	300 ml / 100 l su nimf, ergin 300 ml + 1 l Yazlık yağ / 100 l su nimf, ergin	7 gün
*Bağ	Unlubüt (<i>Planococcus citri</i>)	500 ml / 100 l su tüm dönemlerde	7 gün
Çeltik	Tepegöz (<i>Triops coneriformis</i>)	250 ml / da larva, ergin	7 gün
Elma	Elma pamuklubiti (<i>Eriosoma lanigerum</i>) Elma ağkurdu (<i>Yponomeuta malinellus</i>)	300 ml / 100 l su, ergin, nimf 500 ml / 100 l su larva	7 gün
Fındık	Fındık filiz güvesi (<i>Gypsonoma dealbana</i>)	700 ml/da veya 350 ml/100 l su	7 gün
Genel zararlılar	Çekirgeler (<i>Locusts spp.</i>)	900 ml / da nimf	7 gün
Kiraz	Kiraz sülüğü (<i>Caliroa limacina</i>) Kiraz sineği (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	200 ml / 100 l su larva 300 ml / 100 l su, ergin	7 gün
Mısır	Pamuk çizgili yaprakkurdu (<i>Spodoptera exiqua</i>)	600 ml / da larva	7 gün
Pamuk	Çizgili yaprakkurdu (<i>Spodoptera exiqua</i>) Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>) Yaprakpireleri (<i>Asymmetrasca decedens</i>)	750 ml / da larva 300 ml / da nimf, ergin 500 ml / da nimf, ergin	7 gün
Boş ambar uygulaması	Kuru meyve zararlıları Kuru incir kurdu (<i>Ephesia cautella</i>) Kuru meyve güvesi (<i>Plodia interpunctella</i>) Kuru üzüm güvesi (<i>Ephesia figuliella</i>) İç fındık güvesi (<i>Paralipsa gularis</i>) Ekşilik böcekleri (<i>Carpophilus spp.</i>)	625 ml/100 m ² yüzeye	Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

13 Kasım 2014

PlatinKimya
PLATIN MALATHION

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	1B	İnsektisit (Böcek ilacı)
------	----	-----------------------------

190 g/l Malathion

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Kandaki kolinesteraz enzimini inaktive eder. Baş ağrısı, baş donmesi, sinirlilik, görmede bulanıklık, halsizlik, ishal, solunum zorluğu, terleme salya, kusma, morarma, göz bebeklerinin kuculmesi, titreme, kaslarda seyirme, kasılma ve refleks bozukluğu.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :
İÇİNDEKİLER
Malathion , Cyclohexanone, Solvent naphtha

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H400 Sueul ortamda çok toksiktir.
H410 Sueul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı, elektrikli, havalandırma ve tutuşturucu malzeme kullanın.
P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P331 Kusturmayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın.
Soğuk tutun
P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

Boş ambar uygulaması	<p>Testereli böcek (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>) Kuru meyve akarı (<i>Carpoglyphus lactis</i>) Mısır zararlıları Arpa güvesi (<i>Sitotroga cerealella</i>) Pirinç biti (<i>Sitophilus oryzae</i>) Mısır biti (<i>Sitophilus zeamais</i>) Tütün zararlıları Tütün güvesi (<i>Ephesia elutella</i>) Tatlı kurt (<i>Lasioderma serricorne</i>) Patates zararlıları Patates güvesi (<i>Phthorimaea operculella</i>) Baklagil ambar zararlıları Baklagil tohumböcekleri (<i>Bruchus spp</i>) Fasulye tohumböceği (<i>Acanthoscelides obtectus</i>) Börülce tohumböceği (<i>Callosobruchus maculatus</i>)</p>	625 ml/100 m ² yüzeye	Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Soya	Pamuk çizgili yaprakkurdu (<i>Spodoptera exigua</i>)	750 ml / da larva	7 gün

***Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz**
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.
KALİBRASYON:Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır.Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

13 Kasım 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

 **PlatinKimya**
PLATIN MALATHION

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	IB	Insektisit (Böcek ilacı)
------	----	-----------------------------

190 g/l Malathion

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Yutulması halinde:

Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. Hastayı kusturmaya çalışmayınız. Bilinci yerinde olmayan hastaya ağızdan birşey vermeyiniz. Ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göz ile teması halinde en az 15 dakika bol suyla yıkayınız. Doktor çağırınız.

Deri ile temas halinde

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

ATROPİN SÜLFAT, PAM VE TOXOGONİN'dir. Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg'dan başlayarak 100 mg'a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Uygulama esnasında korunma uyarılarına uyunuz.
- Son uygulama ile hasat arasındaki bekleme süresine uyunuz.
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız. usulüne uygun olarak imha ediniz.
- 40°C'yi geçen sıcaklıklarda uzun süre depolanmamalıdır.
- Tavsiye edildiği dozlarda fitotoksik değildir.
- Süs bitkilerinden Viburnum ve Beyaz çam'da fitotoksite yapar.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA :

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Abi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Sarıyer /İstanbul
Tel : (0 212) 346 0777 (pbx) Fax : (0212) 3460778
FABRİKA ADRESİ
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No : 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elmada altın kelebeğe karşı mecbur kalmadıkça kimyasal mücadele yapılmamalıdır. Diğer mücadele metodları uygulandığında kimyasal mücadele gerekli olmayabilir. uygulamalar ilkbaharda iklim koşullarına bağlı olarak genellikle nisan ortalarına doğru, tırtıllar kışık yuvalarını tamamen terk ettikleri dönemde yapılmalıdır. Genellikle bir uygulama yeterlidir. Biyopreparatların kullanılması tercih edilmelidir.

Elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Elma pamuklubitine karşı mayıs ayından itibaren yapılacak kontrollerde sürgünlerin %10 ununda koloni tesbiti yapılırca uygulama yapılır.

Armut kaplanına karşı ilk uygulama ilkbaharda erginlerin kışlaklarından çıkıp, yapraklara geçtiği fakat henüz yumurta bırakmadığı dönemde yapılır. İkinci uygulama birinci dölün nimflerinin yoğun olduğu zamanda, haziranda yapılır.

Kiraz sülüğüne karşı larvaların yaprakların epidermisinde beslenmeye başladığı zamanda yapılmalıdır. Birinci ve ikinci dölün larvalarına karşı bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 2 uygulama yapılır.

Bağda unlu bite karşı mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem; asmanın gövdesinde kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubitin yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız unlubitingörüldüğü asmalara uygulama yapılmalıdır. İkinci devre, unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı devredir. Asamaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.

Fındık filiz güvesine karşı fındık filiz güvesi ile bulaşık olan bahçelerde bir ön sayım yapılarak mücadeleye gerek olup olmadığına karar verilmelidir. Bu amaçla :1-10 da olan bahçelerde 10 ocak ; 11-30 da olan bahçelerde 20 ocak, 30 da'dan büyük bahçelerde 30 ocak işaretlenir. Her işaretli ocaktan alt, orta ve üst kısımlarından 10'ar olmak üzere toplam 30 yaprak alınıp, zarar belirtisi olanlar sayılır. Zarar görmüş yaprak oranı % 15 olduğunda kimyasal mücadeleye başlanır.

Pamuk pamuk çizgili yaprakkurduna karşı yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.

Pamuk yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise ilaçlama ertelenmelidir. Tarla döneminde 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında mücadele önerilir.

Pamukta yaprakpirelerine karşı rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Mısırdaki pamuk çizgili yaprakkurduna karşı tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5 'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

 **PlatinKimya**
PLATIN MALATHION

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	IB	İnsektisit (Böcek ilacı)
------	----	-----------------------------

190 g/l Malathion

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA :

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş

Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26

Sarıyer /İstanbul

Tel : (0 212) 346 0777 (pbx) Fax : (0212) 3460778

FABRİKA ADRESİ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde

No : 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75


Dr. 
Başkan


TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.