

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Satır No:

Ruhsat tarih ve No.su : 30.04.2014/9644

KULLANILACAGI BITKI VE ZARARLI ORGANIZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Elma ağkurdu (<i>Hyponomeuta malinellus</i>)	60 g / 100 l su (larva)	14 gün
	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	150 g / 100 l su (larva)	14 gün
	Meyve kahverengi akarı (<i>Bryobia rubriculus</i>)	120 g / 100 l su (larva, ergin)	14 gün
	Elma yeşil yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>)	150 g / 100 l su nümph, ergin	14 gün
	Elma gri yaprakbiti (<i>Dysaphis plantaginea</i>)	150 g / 100 l su (larva)	14 gün
	Kırmızı gal yaprakbiti (<i>Dysaphis devecta</i>)	150 g / 100 l su (larva)	14 gün
Şeftali	Şeftali güvesi (<i>Anarsia lineatella</i>)	150 g / 100 l su (larva)	14 gün
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	200 g / 100 l su (larva, ergin)	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmadır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesi uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günde serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKINASININ TEMİZİLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıtırarak tüm parçaların yıklanması sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayın.

X/ TARIM VE ORMAN İKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
22 İşletmeci 2019



PlatinKimya
GOLDAN 50 WP
İNSEKTİSIT
SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUP	IB	İNSEKTİSIT (Böcek ilaç)
		%50 Phosmet

Once etiketi okuyunuz
Evde kullanmayın.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayın.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayın.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL (UZEM) : 114

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :
İÇİNDEKİLER
Phosmet

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT
ZARARLILIK İFADELERİ
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H302 Yutulması halinde zararlıdır
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanım.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimini arayın.
P405 Kilit altında saklayın
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN
DİKKAT EDILECEK HUSUSLAR:

-Arıları zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayın.
-Balıklara ve suda yaşayan diğer canlılara zehirlidir.
-Ürünün artıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çesme yalaklarına bulaştırmayın.
-Boş bitki koruma ürünün ambalajlarını hiç bir gaye için kullanmayın, usulune uygun olarak imha ediniz.

Platin Kimya
İmürkent, İğdır Ticaret A.S.
İGDIR
TURKEY

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma ağurduna karşı bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde,epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılmalıdır.

Elma ,armut ve ayvada elma iç kurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir.Elma içkurduru mücadelede hedef,her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak,yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.Armut ve ayvada tahmin ve erekli uyarı sistemi dikkate alınmaz.

Meyve kahverengi akarına karşı Mayıs ayından itibaren,100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda uygulama yapılmalıdır.

Elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Elma gri yaprakbitine karşı pembe tomurcuk veya çiçek taç yaprakları dökümü döneminden popülasyonun %'u kanatlı forma dönüşünceye kadar 100 sürgünde 2 bulaşık çiçek buketi veya 1-3 koloni görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Kırmızı gal yaprakbitine karşı pembe tomurcuk veya çiçek taç yaprakları dökümü döneminden, popülasyonun %'0 kanatlı forma dönüşünceye kadar 100 sürgünde 5 bulaşık sürgün veya 5-10 koloni görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftali güvesine karşı uygulama zamanı saptanmasında eşyessel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı ve bitki fenolojisinden yararlanılır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15°C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, oacaklarda zararının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir döneminastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda patates bitkisinin yapraklarında patates böceği neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilmekte ve ürünnunde azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik döneminde ve gelişimine bağlı olarak %40' kadar çıkmaktadır.

DIRENÇ İLE İLGİLİ BILGI: GOLDAN 50 WP adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasını sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bunedenle, direnç gelişimini geciktirmek için GOLDAN 50 WP 'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B hariç) bitki koruma ürünlerini kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABILIRLIK DURUMU:

Yüksek asit veya alkali karakterli bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünlerleri ile karışımı hazırlamadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUP	IB	İNSEKTİSİT (Böcek ilaçı)
		%50 Phosmet

İLK YARDIM ÖNEMLERİ:

Yutulması halinde: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. Ürünün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde: Göze değişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde: İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunu su ile yıkayınız. Üründe bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde: Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyorsa oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Antidotu Atropin Sülfat'tır. Belirtilere göre tedavi edilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL (UZEM) : 114



DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörülü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMİ BEYANI :

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMASI:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC. A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt
No: 21/26 Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC. A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısim 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

